

Комплексные многообразия,

лекция 19: теорема Чжоу

Миша Вербицкий

НМУ/НОЦ, Москва

16 мая 2011

Комплексно-аналитические множества и их ростки (повторение)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Комплексно-аналитическое подмножество комплексного многообразия M есть замкнутое подмножество $Z \subset M$, которое локально биголоморфно подмножеству в $U \subset \mathbb{C}^n$, заданному как множество общих нулей какого-то идеала $I \subset \mathcal{O}_U$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть $Z_1, Z_2 \subset M$ комплексно-аналитические подмногообразия. Они называются **эквивалентными в x** , если $Z_1 \cap U = Z_2 \cap U$ для какой-то окрестности $U \ni x$. **Росток комплексно-аналитического подмножества** в $x \in M$ есть класс эквивалентности комплексно-аналитических подмножеств $Z \subset U \ni x$ по отношению к "эквивалентности в x ."

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Росток комплексно-аналитического подмножества Z в $x \in M$ называется **неприводимым**, если не существует нетривиального разложения $Z = A_1 \cup A_2$ на два комплексно-аналитических подмножества.

УТВЕРЖДЕНИЕ: Росток комплексно-аналитического подмножества Z неприводим тогда и только тогда, когда идеал I_Z ростков функций, зануляющихся в Z , простой.

СЛЕДСТВИЕ: Каждый росток комплексно-аналитического множества разлагается в конечное объединение неприводимых.

Регулярная система координат для идеала (повторение)

ТЕОРЕМА: Пусть J – простой идеал в \mathcal{O}_n . Тогда найдется система координат $z_1, \dots, z_d, z_{d+1}, \dots, z_n$ в окрестности 0 , такая, что

1. $J_d = 0$, где J_d – множество функций $f \in J$, которые зависят только от первых d координат.
2. Для каждого $k > d$, найдется полином Вейерштрасса $P_k \in J_k$ вида $P_k(z_1, \dots, z_{k-1}, z_k) = z_k^{s_k} + \sum_{i=0}^{s_k-1} \alpha_i z_k^i$, где α_i – аналитические функции, которые зависят только от первых $k-1$ координат.
3. Идеал J порожден P_i .

Более того, система координат $z_1, \dots, z_d, z_{d+1}, \dots, z_n$ может быть выбрана таким образом, что векторы $\frac{d}{dz_i}|_0$ будут сколь угодно близки к любому заданному базису в $T_0\mathbb{C}^n$.

ТЕОРЕМА: (Теорема о конечности)

Пусть z_1, \dots, z_n – регулярная система координат для идеала $J \subset \mathcal{O}_n$, а \mathcal{O}_d – голоморфные функции, зависящие только от z_1, \dots, z_d . Тогда кольцо \mathcal{O}_n/J конечно порождено как \mathcal{O}_d -модуль.

СЛЕДСТВИЕ: Каждый росток комплексно-аналитического множества допускает конечное, сюръективное отображение на диск.

Комплексные многообразия (повторение)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть $Z \subset \mathbb{C}^n$ – комплексно-аналитическое подмножество. Назовем точку $z \in Z$ **гладкой**, если в окрестности z , Z – гладкое подмногообразие, и **особой** в противном случае.

ТЕОРЕМА: Пусть $Z \subset \mathbb{C}^n$ – комплексно-аналитическое подмножество, а $Z_{\text{sing}} \subset Z$ – множество особых точек Z . **Тогда Z_{sing} – комплексно-аналитическое подмножество**, а его дополнение плотно в Z .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: **Комплексное многообразие** (“variety”) есть окольцованное пространство, локально изоморфное комплексно-аналитическому подмножеству с пучком голоморфных функций на нем.

ПРИМЕР: Если X – комплексное многообразие, то X_{sing} – **комплексное подмногообразие в нем**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Комплексное многообразие называется **неприводимым**, если его нельзя разложить в нетривиальное конечное объединение замкнутых комплексных подмногообразий.

УПРАЖНЕНИЕ: Докажите, что комплексное многообразие **неприводимо тогда и только тогда, когда множество его гладких точек связно**.

“Принцип максимума”

ТЕОРЕМА: (“Принцип максимума для голоморфных функций”)

Пусть f – голоморфная функция на компактном, неприводимом комплексном многообразии Z , причем $|f|$ достигает максимума в какой-то точке Z . **Тогда f постоянна.**

Немедленно вытекает из следующего утверждения.

УТВЕРЖДЕНИЕ: Пусть f – непостоянная голоморфная функция на неприводимом комплексном многообразии Z . **Тогда f открыто,** то есть переводит открытые множества в открытые.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Пусть $x \in Z$. Воспользовавшись регулярными координатами, найдем неприводимый росток гладкой кривой $C \rightarrow Z_x$, на которой f непостоянно. **Тогда $f|_C$ содержит окрестность $f(x)$.** ■

СЛЕДСТВИЕ: Пусть $Z \subset \mathbb{C}^n$ – компактное комплексное подмногообразие. **Тогда Z – конечное множество.**

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Голоморфные функции разделяют точки Z . ■

Конечные отображения и размерность (повторение)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Собственное отображение топологических пространств есть непрерывное отображение, такое, что прообраз любого компакта компактен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Конечное отображение комплексных многообразий есть голоморфное отображение, которое собственное, причем прообраз любой точки – конечное множество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Размерность неприводимого комплексного многообразия есть размерность множества его гладких точек. Размерность приводимого многообразия есть максимум размерностей всех его компонент.

УТВЕРЖДЕНИЕ: $\dim X > \dim X_{\text{sing}}$.

ТЕОРЕМА: ("теорема о постоянном ранге") Пусть $F : X \rightarrow Y$ – голоморфное отображение, причем X гладко, а ранг $\text{rk } F := \text{rk } dF$ постоянный. Тогда **у каждой точки $x \in X$ есть окрестность $U \ni x$, такая, что $F(U)$ – гладкое многообразие размерности $\text{rk } F$, а слои $F^{-1}(z) \cap U$ – гладкие подмногообразия размерности $\ker dF$.**

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Следует из теоремы об обратной функции.

Свойства конечных отображений

ЛЕММА: Пусть $F : X \rightarrow Y$ – голоморфное отображение комплексных многообразий, которое **конечно**, то есть собственное и имеет конечные слои. **Тогда** $\dim X \leq \dim Y$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Воспользовавшись теоремой о конечности, найдем конечное отображение из Y в диск D той же размерности. Заменяя Y на D , можно считать, что Y это диск. Пусть $x \in X$ – гладкая точка, в которой dF имеет максимальный ранг. Тогда **слой F в x имеет ту же размерность, что и $\ker dF|_x$, по теореме о постоянном ранге.** Следовательно, $\ker dF = 0$. ■

Свойства конечных отображений (продолжение)

(*) **УТВЕРЖДЕНИЕ:** Пусть $F : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^m$ – линейное, сюръективное отображение, а $Z \subset \mathbb{C}^n$ – росток комплексно-аналитического подмножества, такой, что $F^{-1}(0) \cap Z = 0$. **Тогда $F : Z \cap U \longrightarrow U'$ конечно для каких-то окрестностей нуля в $\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^m$.**

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Возьмем окрестность 0 в \mathbb{C}^n в виде полидиска $D \times D'$, где F проектирует $D \times D'$ на D' вдоль D . Выбрав D' достаточно маленьким, можно считать, что $Z \cap \partial D \times D' = \emptyset$. Из этого следует, что $F|_{Z \cap D \times D'} : Z \cap D \times D' \longrightarrow D'$ – собственное отображение. **Конечность слоев $F|_{Z \cap D \times D'}$ следует из принципа максимума** (компактное подмножество образа диска конечно). ■

Ранг голоморфного отображения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть $F : X \rightarrow Y$ – голоморфное отображение комплексных многообразий. Определим **ранг F в x** как $\text{rk}_x F := \dim(X, x) - \dim(F^{-1}(F(x)), x)$.

ТЕОРЕМА: Ранг $\text{rk}_x F$ полунепрерывен сверху как функция x .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Пусть $F : (X, x) \rightarrow (Y, y)$ – росток голоморфного отображения, причем $F^{-1}(y)$ имеет размерность k . Будем считать, что (X, x) вложено в $(\mathbb{C}^n, 0)$. Рассмотрим общую гиперплоскость $V \subset \mathbb{C}^n$ размерности $n - k$, которая проходит через x и пересекается с $F^{-1}(y)$ по конечному множеству. Тогда $F|_{V \cap X}$ – конечное отображение в некоторой окрестности x , в силу утверждения (*), поэтому $F^{-1}(F(x'))$ пересекается с V по конечному множеству для любого x' в окрестности x . Следовательно. $\dim F^{-1}(F(x')) \leq \dim(F^{-1}(F(x)), x)$. ■

ЗАМЕЧАНИЕ: Мы доказали, что множество точек x , где $\text{rk} F$ максимален, открыто.

Теорема о ранге отображения

ТЕОРЕМА: ("теорема о ранге") Пусть $F : X \longrightarrow Y$ – сюръективное голоморфное отображение комплексных многообразий. **Тогда**

$$\dim Y = \sup_{x \in X} \operatorname{rk}(F, x).$$

Доказательство. Шаг 1: Пусть $X_1 \subset X$ – множество гладких точек X , где ранг максимален. Тогда $\dim F(X_1) = \sup_{x \in X} \operatorname{rk}(F, x)$ по теореме о постоянном ранге. Значит, **замыкание $F(X_1)$ имеет размерность $\sup_{x \in X} \operatorname{rk}(F, x)$.**

Шаг 2: Пусть X'_1 – множество гладких точек в дополнении к замыканию X_1 ; это открытое, гладкое подмногообразие в X . Обозначим за X_2 множество точек X'_1 , где $\operatorname{rk}(F|_{X'_1})$ максимален. Повторив эту процедуру, получим **набор непересекающихся, открытых, гладких подмногообразий $\overline{X_1 \sqcup X_2 \sqcup X_3 \sqcup \dots} = X$, причем $\operatorname{rk} F|_{X_i}$ постоянный на каждом X_i и убывает как функция i .**

Шаг 3: Снова применив теорему о постоянном ранге, получим, что $\dim F(X_i) < \dim F(X_1)$, значит, **$F(X)$ есть замыкание объединения комплексных подмногообразий ранга $\leq \sup_{x \in X} \operatorname{rk}(F, x)$.** ■

Теорема Реммерта и Реммерта-Штейна (схема доказательства)

ТЕОРЕМА: ("Теорема Реммерта-Штейна") Пусть X – комплексное многообразие, $A \subset X$ – комплексно-аналитическое подмножество, а Z – неприводимое комплексно-аналитическое подмножество в $X \setminus A$. Предположим, что $\dim Z > \dim A$. **Тогда замыкание \bar{Z} комплексно-аналитично в X .**

ТЕОРЕМА: ("Теорема Реммерта о собственном отображении") Пусть $F : X \rightarrow Y$ – собственный морфизм комплексных многообразий. **Тогда $F(X)$ комплексно-аналитично в Y .**

Доказательство этих теорем ведется индуктивно.

(РШ _{m}): утверждение теоремы Реммерта-Штейна верно для $\dim X \leq m$.

(Р _{m}): утверждение теоремы Реммерта верно для $\dim X \leq m$.

Мы доказываем два утверждения:

А. (РШ _{m}) и (Р _{$m-1$}) влечет (Р _{m}).

Б. (Р _{$m-1$}) влечет (РШ _{m}).

Теорема Реммерта и Реммерта-Штейна: утверждение А.**Доказательство импликации А: $(P_{Ш_m})$ и $(P_{m-1}) \Rightarrow (P_m)$:**

Шаг 1: Пусть X_1 – множество всех точек X , где $rk(F)$ не максимальный, а $X' := X \setminus (X_{\text{sing}} \cup X_1)$. По теореме о постоянном ранге, $F(X')$ **аналитическое в окрестности каждой точки, которая не принадлежит $F(X_1) \cup F(X_{\text{sing}})$.**

Шаг 2: Воспользовавшись (P_{m-1}) , можно считать, что $F(X_1)$ и $F(X_{\text{sing}})$ **комплексно-аналитические.**

Шаг 3: По теореме о ранге,

$$\dim F(X_{\text{sing}}) = \sup_{x \in X_{\text{sing}}} rk(F|_{X_{\text{sing}}}, x) =$$

$$\dim X_{\text{sing}} - \inf_{x \in X_{\text{sing}}} \dim F^{-1}(F(x)) < rk \sup_{x \in X} rk(F, x) = \dim F(X').$$

Аналогично, $\dim F(X_1) = \sup_{x \in X_1} rk(F|_{X_1}, x) < \sup_{x \in X} rk(F, x) = \dim F(X')$.

Шаг 4: Теперь утверждение А **получается применением $P_{Ш_m}$ к $Z = F(X')$ и $A = F(X_1) \cup F(X_{\text{sing}})$.**

Теорема Реммерта и Реммерта-Штейна: утверждение Б.

Доказательство импликации Б: $(P_{m-1}) \Rightarrow (PШ_m)$:

Шаг 1: Воспользовавшись индукцией по $\dim A$, **можно считать, что A гладко, а Z неприводимо.**

Шаг 2: Применив подходящий голоморфный диффеоморфизм, можно считать, что Z вложено в диск $B \subset \mathbb{C}^n$, а $A \subset B$ – линейное подпространство там же. Рассмотрим линейную форму, которая не равна тождественно нулю на Z . Она высекает на Z подмногообразие положительной коразмерности. Воспользовавшись индукцией, мы **построим линейную проекцию $F : B \rightarrow \mathbb{C}^{\dim Z}$ такую, что $F^{-1}(0) \cap (Z \cup A)$ имеет размерность ноль.**

Шаг 3: Применив тот же аргумент, что доказывает утверждение (*), найдем полидиск $D \times D' \subset B$ такой, что проекция F отображает $D \times D'$ в D' , причем $F|_{(Z \cup A) \cap D \times D'} : (Z \cup A) \cap D \times D' \rightarrow D'$ **конечно** (собственно и с конечными слоями). Заменяем Z на $Z \cap D \times D'$ и A на $A \cap D \times D'$.

Теорема Реммерта и Реммерта-Штейна: утверждение Б (продолжение).

Шаг 4: Пусть A' – объединение A и множества всех точек, где $F|_Z$ не диффеоморфизм, а $Z' := Z \setminus F^{-1}(F(A'))$. Тогда $F|_{Z'}$ – конечное и неразветвленное накрытие, следовательно, оно q -листно. Множество $A' \cap Z$ аналитично потому что это дискриминант голоморфного отображения. **В силу (P_{m-1}) , образ $F(A' \cap Z)$ – комплексно-аналитический.**

Шаг 5: Пусть $F_1 : D \times D' \rightarrow D_1 \times D'$ – линейная проекция, тождественная на D' , причем диск D_1 одномерен. Для доказательства $(PШ_m)$, достаточно убедиться, что $F_1(\bar{Z})$ комплексно-аналитическое. Поэтому **МОЖНО считать, что диск D одномерен.**

Шаг 6: В этой ситуации, Z' есть график q -листного отображения

$$D' \setminus F(A') \rightarrow \text{Sym}^q(\mathbb{C}), \quad \zeta_1, \dots, \zeta_q : D' \setminus F(A') \rightarrow \mathbb{C}.$$

Коэффициенты элементарных симметрических полиномов от ζ_1, \dots, ζ_q – голоморфные функции на $D' \setminus F(A')$, которые ограничены на D' , значит, **продолжаются до голоморфных функций e_0, \dots, e_{q-1} на D' .**

Шаг 7: Мы получили, что замыкание Z **задается уравнением $t^q + e_1 t^{q-1} + \dots + e_q = 0$ в $\mathbb{C} \times D'$** , значит, Z' комплексно-аналитично. ■

Теорема Чжоу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Подмножество $\mathbb{C}P^n$ называется **проективным под-многообразием**, если это множество общих нулей однородного идеала в кольце однородных полиномов на \mathbb{C}^{n+1} .

ТЕОРЕМА: Пусть $Z \subset \mathbb{C}P^n$ – замкнутое комплексно-аналитическое под-множество. **Тогда Z проективно.**

Доказательство. Шаг 1: Рассмотрим естественную проекцию $\mathbb{C}^{n+1} \setminus 0 \rightarrow \mathbb{C}P^n$, и пусть $C_0(Z)$ – прообраз Z . **Применив Реммерта-Штейна, получим, что его замыкание $C(Z)$ – комплексное под-многообразие.**

Шаг 2: Пусть I_Z – идеал $C(Z)$ в кольце ростков. Рассмотрим действие \mathbb{C}^* на \mathbb{C}^{n+1} растяжениями. Поскольку Z \mathbb{C}^* -инвариантно, **идеал I_Z \mathbb{C}^* -инвариантен.**

Шаг 3: Пусть $f \in I_Z$, а $f = \sum P_i$ ее разложение в ряд Тэйлора, где P_i – однородные полиномы степени i на \mathbb{C}^{n+1} . Тогда \mathbb{C}^* действует на f по формуле $\rho_\lambda(f) = \sum \lambda^i P_i$. Поскольку I_Z \mathbb{C}^* -инвариантно, **функции $\frac{d^s}{d\lambda^s} \rho_\lambda(f) = \sum_{r=s}^{\infty} \binom{r}{s} \lambda^{r-s} P_r$ лежат в I_Z .**

Шаг 4: Положив $\lambda = 0$, получим, что **$P_r \in I_Z$ для любого $r \geq 0$.** ■