

Комплексные поверхности,

лекция 13: $\partial\bar{\partial}$ -лемма для поверхностей с четным b_1

Миша Вербицкий

НМУ/матфак ВШЭ, Москва

14 мая 2012

Метрики Годушона (повторение)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть ω - эрмитова форма комплексного эрмитова многообразия M , $\dim_{\mathbb{C}} M = n$. Метрика на M называется **метрикой Годушона**, если $\partial\bar{\partial}(\omega^{n-1}) = 0$.

ТЕОРЕМА: (П. Годушон, 1977) Пусть (M, ω) – компактное, комплексное, эрмитово n -мерное многообразие. Тогда **существует единственная** (с точностью до постоянного множителя) **положительная функция** $\psi \in C^{\infty}M$ **такая, что $\psi\omega$ - метрика Годушона.**

Доказательство теоремы Годушона следует из сильного принципа максимума и теоремы об индексе для эллиптических операторов.

Автодуальные формы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть η – 2-форма на 4-мерном ориентированном римановом многообразии M . Она называется **автодуальной**, если $*\eta = \eta$, и **антиавтодуальной**, если $*\eta = -\eta$.

ЗАМЕЧАНИЕ: Автодуальность равносильна условию $\eta \wedge \eta = |\eta|^2 \text{Vol}$, где Vol – форма риманова объема, а $|\eta|$ евклидова норма на 2-формах, индуцированная римановой структурой. Антиавтодуальность равносильна $\eta \wedge \eta = -|\eta|^2 \text{Vol}$ (**докажите это**).

ЗАМЕЧАНИЕ: Замена ориентации на M **переставляет автодуальные и антиавтодуальные формы**. Из разложения

$$\Lambda^2 M = \Lambda^+ M \oplus \Lambda^- M,$$

получаем $\dim \Lambda^+ M = \dim \Lambda^- M = 3$, где $\Lambda^+ M$, $\Lambda^- M$ – расслоение автодуальных и антиавтодуальных форм.

Примитивные формы

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть (M, ω) - комплексное эрмитово многообразие, $L_\omega : \Lambda^{p,q}(M) \rightarrow \Lambda^{p+1,q+1}(M)$ оператор внешнего умножения на ω , а $\Lambda_\omega = *L_\omega*$ - сопряженный оператор. Форма η называется **примитивной**, если $p + q \leq \dim_{\mathbb{C}} M$, а $\Lambda_\omega(\eta) = 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ: Пусть M - комплексная эрмитова поверхность, $\xi_1, \xi_2 \in \Lambda^{1,0}(M)$ - ортонормированный базис. Тогда

$$\Lambda_\omega(\xi_1 \wedge \bar{\xi}_1) = 1, \quad \Lambda_\omega(\xi_2 \wedge \bar{\xi}_2) = 1, \quad \Lambda_\omega(\xi_1 \wedge \bar{\xi}_2) = 0, \quad \Lambda_\omega(\xi_2 \wedge \bar{\xi}_1) = 0,$$

Получаем, что **расслоение вещественных примитивных $(1,1)$ -форм трехмерно, и порождено формами**

$$\sqrt{-1} (\xi_1 \wedge \bar{\xi}_1 - \xi_2 \wedge \bar{\xi}_2), \quad \xi_1 \wedge \bar{\xi}_2 - \sqrt{-1} \xi_2 \wedge \bar{\xi}_1, \quad \xi_2 \wedge \bar{\xi}_1 - \sqrt{-1} \xi_1 \wedge \bar{\xi}_2.$$

СЛЕДСТВИЕ: Пусть M - комплексная эрмитова поверхность. **2-форма $\eta \in \Lambda^2(M)$ анти-автодуальна тогда и только тогда, когда она имеет тип $(1,1)$ и примитивна. ■**

Метрики Годушона и когомологии $H^1(\mathcal{O}_M)$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Пусть (M, ω) – компактное комплексное n -многообразие с метрикой Годушона, а $\alpha \in \Lambda^{0,1}(M)$ – $\bar{\partial}$ -замкнутая 1-форма. Определим **степень**

$$\deg \alpha := \frac{\int_M \partial \alpha \wedge \omega^{n-1}}{\int_M \omega^n}$$

ЗАМЕЧАНИЕ: Из формулы Стокса и $\partial \bar{\partial} \omega^{n-1} = 0$ следует, что $\int_M \partial \bar{\partial} f \wedge \omega^{n-1} = 0$ для любой функции $f \in C^\infty M$ (**докажите это**). Поэтому $\deg \alpha = 0$, если α $\bar{\partial}$ -точна. **Мы получили, что \deg задает функционал на группе когомологий $\bar{\partial}$.**

ЗАМЕЧАНИЕ: Резольвента $\mathcal{O}_M \xrightarrow{\bar{\partial}} \Lambda^{0,1}(M) \xrightarrow{\bar{\partial}} \Lambda^{0,2}(M) \xrightarrow{\bar{\partial}} \dots$ пучка \mathcal{O}_M голоморфных функций **ациклична**, значит, **когомологии $\bar{\partial}$ суть когомологии \mathcal{O}_M , и \deg задает функционал на $H^1(\mathcal{O}_M)$.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Отображение $H^1(\mathcal{O}_M) \xrightarrow{\deg} \mathbb{C}$ называется **степенью** класса когомологий.

Метрики Годушона и когомологии $H^1(\mathcal{O}_M)$ (продолжение)

ЗАМЕЧАНИЕ: Напомню, что $(0, p)$ -форма η называется **антиголоморфной**, если $\partial\bar{\eta} = 0$. Степень замкнутой, антиголоморфной $(0, 1)$ -формы равна нулю. **Согласно теории Ходжа, на кэлеровом многообразии каждый класс когомологий $H^1(\mathcal{O}_M)$ может быть представлен антиголоморфной, замкнутой формой.** Поэтому для кэлерова многообразия отображение $H^1(\mathcal{O}_M) \xrightarrow{\text{deg}} \mathbb{C}$ равно нулю.

Эллиптические операторы, зануляющиеся на константах

ТЕОРЕМА: Пусть D – эллиптический оператор второго порядка на компактном многообразии, зануляющийся на константах. **Тогда $\text{coker } D$ одномерен.**

Доказательство. Шаг 1: На M существует метрика такая, что символ D есть символ оператора Лапласа Δ (**докажите это**).

Шаг 2: Поскольку оператор Лапласа автодуален, $\dim \ker \Delta = \dim \text{coker } \Delta$ (**докажите это**).

Шаг 3: Значит, индекс Δ равен нулю. **По теореме об индексе, индекс зависит только от символа**, значит $\text{ind } D = 0$.

Шаг 4: В силу принципа максимума, любая функция $f \in \ker D$ постоянна. **Поэтому $\ker D$ одномерный.**

Шаг 5: Из шага 3 следует, что $\text{ind } D = 0$, **значит $\text{coker } D$ тоже одномерный.** ■

Когомологии $H^1(\mathcal{O}_M)$ и эллиптические операторы

Теорема 1: Пусть (M, ω) – компактное комплексное n -многообразие с метрикой Годушона. **Для любого класса когомологий $[\alpha] \in H^1(\mathcal{O}_M)$, существует единственный представитель $\alpha \in \Lambda^{0,1}(M)$ такой, что**

$$\partial\alpha \wedge \omega^{n-1} = \deg[\alpha]\omega^n. \quad (*)$$

Доказательство. Шаг 1: Пусть $\alpha_0 \in \Lambda^{0,1}(M)$ – представитель $[\alpha]$. Решения $(*)$ это формы вида $\alpha_0 + \bar{\partial}f$, удовлетворяющие

$$\partial\bar{\partial}f \wedge \omega^{n-1} = \deg[\alpha]\omega^n - \partial\alpha_0 \wedge \omega^{n-1}. \quad (**)$$

Шаг 2: Отображение $D(f) := \partial\bar{\partial}f \wedge \omega^{n-1}$ из функций в (n, n) -формы – эллиптический оператор второго порядка, зануляющийся на константах **(проверьте это)**. В силу предыдущей теоремы, **кядро D одномерно**.

Шаг 3: Для каждой функции $f \in C^\infty M$, имеем $\int \partial\bar{\partial}f \wedge \omega^{n-1} = 0$, потому что $\partial\bar{\partial}(\wedge\omega^{n-1}) = 0$. Поскольку кядро D одномерно, **его образ есть множество всех (n, n) -форм, удовлетворяющих $\int_M \alpha = 0$** .

Шаг 4: Чтобы решить $(**)$, осталось убедиться, что

$$\int_M \left(\deg[\alpha]\omega^n - \partial\alpha_0 \wedge \omega^{n-1} \right) = 0$$

(убедитесь). ■

Антиголоморфные $(0,1)$ -формы и классы когомологий

СЛЕДСТВИЕ: Пусть (M, ω) – комплексная поверхность с метрикой Годушона, а $[\alpha] \in H^1(\mathcal{O}_M)$ – класс когомологий с $\deg[\alpha] = 0$. **Тогда $[\alpha]$ представляется антиголоморфной формой.**

Доказательство. Шаг 1: Пусть $\alpha \in \Lambda^{0,1}(M)$ – представитель $[\alpha]$, который удовлетворяет $\partial\alpha \wedge \omega = 0$, $\bar{\partial}\alpha = 0$ (он существует в силу предыдущего утверждения).

Шаг 2: Тогда $\partial\alpha = d\alpha$ – примитивная $(1,1)$ -форма. Поскольку примитивные $(1,1)$ -формы антиавтодуальны, имеем

$$0 = \int_M d\alpha \wedge d\bar{\alpha} = - \int_M |\operatorname{Re}(d\alpha)|^2 \operatorname{Vol}$$

значит, $d\alpha = 0$ всюду на M . ■

СЛЕДСТВИЕ: Для любой поверхности, фактор $H^1(\mathcal{O}_M)/H_a^1(\mathcal{O}_M)$ когомологий по пространству $H_a^1(\mathcal{O}_M)$ антиголоморфных замкнутых форм не более чем одномерный.

Антиголоморфные $(0,1)$ -формы на поверхности

ЛЕММА: На поверхности, голоморфные (и антиголоморфные) 1-формы **обязательно замкнуты.**

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Рассмотрим голоморфную 1-форму $\rho \in \Omega^1 M$. Тогда $d\rho$ это точная $(2,0)$ -форма. Но $\int_M d\rho \wedge d\bar{\rho} = \int_M \text{Vol} |d\rho|^2 = 0$, значит, $d\rho = 0$ всюду на M . ■

УТВЕРЖДЕНИЕ:

Ненулевая линейная комбинация антиголоморфных и голоморфных 1-форм на компактной поверхности **не может быть точна.**

Доказательство. Шаг 1: Пусть v – такая линейная комбинация. Тогда $I(v)$ тоже линейная комбинация антиголоморфных и голоморфных 1-форм. **В силу предыдущей леммы, $I(v)$ замкнуто.**

Шаг 2: Если v точно, $v = d\varphi$, мы имеем $0 = dIv = d^c d\varphi$, где $d^c = -I \circ d \circ I$.

Шаг 3: Эллиптический оператор $\varphi \rightarrow d^c d\varphi \wedge \omega$ зануляется на константах **проверьте эллиптичность, и в силу принципа максимума его ядро состоит из констант.** Значит, $\varphi = \text{const}$. ■

Естественное вложение $H^1(M) \rightarrow H^1(\mathcal{O}_M) \oplus \overline{H^1(\mathcal{O}_M)}$

ЗАМЕЧАНИЕ: (А) Из предыдущего утверждения следует, что **существует вложение**

$$H^0(\Omega^1 M) \oplus \overline{H^0(\Omega^1 M)} \hookrightarrow H^1(M)$$

где $\overline{H^0(\Omega^1 M)}$ обозначает пространство антиголоморфных форм.

УТВЕРЖДЕНИЕ: (Б) Для любого компактного комплексного многообразия, **определено естественное вложение**

$$H^1(M) \hookrightarrow H^1(\mathcal{O}_M) \oplus \overline{H^1(\mathcal{O}_M)},$$

переводящее v в $[v^{0,1}] \in H^1(\mathcal{O}_M)$, $v^{1,0} \in \overline{H^1(\mathcal{O}_M)}$, где $\overline{H^1(\mathcal{O}_M)}$ обозначает векторное пространство с сопряженной комплексной структурой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: Для каждой замкнутой формы $v \in \Lambda^1(M)$, $(1,0)$ и $(0,1)$ -части v замкнуты относительно ∂ и $\bar{\partial}$, что дает классы когомологий $[v^{0,1}] \in H^1(\mathcal{O}_M)$ и $[v^{1,0}] \in \overline{H^1(\mathcal{O}_M)}$. Если эти классы равны нулю, то $v = \bar{\partial}\varphi_1 + \partial\varphi_2$. Из $dv = 0$ получаем

$$0 = d(\bar{\partial}\varphi_1 + \partial\varphi_2) = \partial\bar{\partial}\varphi_1 + \bar{\partial}\partial\varphi_2 = \partial\bar{\partial}(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Оператор $f \rightarrow \partial\bar{\partial}f \wedge \omega^{n-1}$ эллиптический (**проверьте**) и зануляется на констатах; поэтому $\partial\bar{\partial}(\varphi_1 - \varphi_2) = 0$ влечет $\varphi_1 - \varphi_2 = 0$. ■

Комплексные поверхности с нечетным b_1

ТЕОРЕМА: Пусть M - компактная комплексная поверхность. Тогда $b_1(M)$ четно, если $H^1(\mathcal{O}_M)$ порождено антиголоморфными 1-формами, и нечетно в противном случае.

Доказательство. Шаг 1: Рассмотрим вложения

$$H^0(\Omega^1 M) \oplus \overline{H^0(\Omega^1 M)} \hookrightarrow H^1(M, \mathbb{C}) \xrightarrow{j} H^1(\mathcal{O}_M) \oplus \overline{H^1(\mathcal{O}_M)}.$$

(утверждения А и Б). Если $H^1(\mathcal{O}_M)$ порождено антиголоморфными 1-формами, все эти вложения – изоморфизмы.

Шаг 2: Напомню, что **степенью** $\bar{\partial}$ -замкнутой $(0,1)$ -формы η на многообразии с метрикой Годушона называется число $\int_M \partial\eta \wedge \omega^{n-1}$. **Любая $\bar{\partial}$ -замкнутая $(0,1)$ -форма нулевой степени когомологична антиголоморфной, как доказано в Теореме 1.**

Шаг 3: Следовательно, если $\deg : H^1(\mathcal{O}_M) \rightarrow \mathbb{C}$ равен нулю, то вложение $H^0(\Omega^1 M) \rightarrow \overline{H^1(\mathcal{O}_M)}$, построенное на шаге 1, является изоморфизмом. В противном случае, последовательность

$$0 \rightarrow H^0(\Omega^1 M) \rightarrow \overline{H^1(\mathcal{O}_M)} \xrightarrow{\deg} \mathbb{C} \rightarrow 0$$

точная.

Комплексные поверхности с нечетным b_1 (продолжение)

Шаг 4: Пусть $[\alpha], [\beta] \in H^1(\mathcal{O}_M)$, $\deg[\alpha] = \overline{\deg[\beta]}$. Выберем представители $\alpha, \beta \in \Lambda^{0,1}(M)$ такие, что $d\alpha = \deg[\alpha]\omega$, $d\beta = \deg[\beta]\omega$ (Теорема 1). Тогда $d(\alpha - \beta) = 0$. Мы получили, что **образ вложения $H^1(M, \mathbb{C}) \xrightarrow{j} H^1(\mathcal{O}_M) \oplus \overline{H^1(\mathcal{O}_M)}$ лежит в ядре \deg .**

Шаг 5: Каждый класс $[\alpha] \in H^1(\mathcal{O}_M)$ нулевой степени представляется антиголоморфной (следовательно, замкнутой) формой. Значит, **образ j – в точности формы степени 0.** Мы получили, что j является изоморфизмом, либо последовательность

$$0 \rightarrow H^1(M) \xrightarrow{j} H^1(\mathcal{O}_M) \oplus \overline{H^1(\mathcal{O}_M)} \xrightarrow{\deg} \mathbb{C} \rightarrow 0.$$

точна.

Шаг 6: В первом случае, $H^1(M)$ четномерно, во втором нечетномерно,

■

$\partial\bar{\partial}$ -лемма для поверхностей с четным b_1

ЗАМЕЧАНИЕ: В доказательстве кэлеровости комплексных поверхностей с четным b_1 , используется не сама четность, а следующее полезное свойство поверхностей с четным b_1 .

ЛЕММА: ($\partial\bar{\partial}$ -лемма для поверхностей с четным b_1). Пусть M - компактная комплексная поверхность с четным $b_1(M)$, а $\eta \in \Lambda^{1,1}(M)$ – точная $(1,1)$ -форма. **Тогда $\eta = \partial\bar{\partial}\psi$, для какой-то функции $\psi \in C^\infty M$.**

Доказательство. Шаг 1: Имеем $\eta = d\rho$, значит, $\eta = \partial\rho^{0,1} + \bar{\partial}\rho^{1,0}$, где $\rho^{1,0}$ и $\rho^{0,1}$ - $(1,0)$ и $(0,1)$ -части. Поскольку η типа $(1,1)$, имеем $\partial\rho^{1,0} = \bar{\partial}\rho^{0,1} = 0$.

Шаг 2: В силу предыдущего следствия, ∂ -замкнутая $(1,0)$ -форма является суммой голоморфной и ∂ -точной, а $\bar{\partial}$ -замкнутая $(0,1)$ -форма является суммой антиголоморфной и $\bar{\partial}$ -точной. Отбросив антиголоморфные и голоморфные компоненты, которые не дают вклада в $\partial\rho^{0,1} + \bar{\partial}\rho^{1,0}$, получим $\rho^{1,0} = \partial\psi$, $\rho^{0,1} = \bar{\partial}\varphi$, Следовательно

$$\eta = \partial\rho^{0,1} + \bar{\partial}\rho^{1,0} = \partial\bar{\partial}\varphi - \partial\bar{\partial}\psi.$$

■